

台灣葡萄露菌病之防治

郭克忠¹ 高清文² 呂理燊¹

1. 台中縣 台灣省農業藥物毒物試驗所

2. 台北市 行政院農業委員會

接受日期：中華民國 81 年 1992 年 4 月 20 日

摘要

郭克忠、高清文、呂理燊. 1992. 台灣葡萄露菌病之防治. 植病會刊 1:49-56.

游走孢子囊在懸浮液中於 24°C 經 1 小時釋放游走子，游走子與寄主接觸後 20–60 分鐘完成侵入，6 小時後形成第一個吸器。接種 96 小時後可形成病斑，並產生游走孢子囊。測試 15 種殺菌劑對本病菌游走子釋放、產胞之影響，結果鋅錳乃浦抑制游走子釋放之效果最佳，其完全抑制濃度為 10 ppm，唯滅達樂及克絕則無此作用。測試 10 種推薦藥劑對本菌侵入葉片至產胞的影響，所有供試藥劑在本菌侵入前或侵入後及有病斑產胞者浸藥，均有防治效果，其中 7 種可以完全抑制產胞，侵入 24 小時後才浸藥，則僅 80% Fosetyl-Al W.P.、8% Cymoxanil + 64% Mancozeb W.P. 及 10% Metalaxyl + 48% Mancozeb W.P. 等藥劑有明顯抑制效果，侵入後 96 小時及 120 小時後施藥，則僅 80% Mancozeb W.P. 及 10% Metalaxyl + 48% Mancozeb W.P. 效果最佳，除殺死已產胞者外，經 96 小時觀察時能抑制再產胞。於溫室以盆栽葡萄測試 80% Mancozeb W.P. 600 倍、10% Metalaxyl + 48% Mancozeb W.P. 400 倍及 8% Cymoxanil + 64% Mancozeb W.P. 750 倍等三種藥劑存留在植體上有效完全抑制露菌病發生時間均不能超過 2 週。田間試驗，以 10% Metalaxyl + 48% Mancozeb W.P. 400 倍、80% Mancozeb W.P. 600 倍、8% Cymoxanil + 64% Mancozeb W.P. 750 倍三種藥劑輪用之防治效果較佳，約可維持一個月的保護效果。

關鍵字：葡萄露菌病、殺菌劑、防治。

緒言

葡萄為本省重要果樹產業(2)，栽培面積達五千公頃，產值每年達 12 億 5 千萬元，葡萄在本省特殊栽培環境，病害種類達 12 種以上(5)，因此在特定時間內，病害全程防治上，不能祇為防治某一特定病害，而忽略其他病害，故在設計防治策略時，用藥時機、藥劑種類及避免產生抗藥性菌株均需考慮。露菌病為本省葡萄栽培前期之主要限制因子。然而目前推薦藥劑達 11 種以上，農民往往不知如何選擇用藥，錯失用藥時機或誤用農藥因而造成嚴重減產。本研究乃將目前已推薦或具潛勢之藥劑加以篩選比較，並擬訂較佳之用藥組合，以供農民之參考。

葡萄露菌病係由卵菌綱之露菌 *Plasmopara viticola* (Berk. & Curt.) Berl. & de Toni 所引起，主要危害葉片、果軸、幼果及嫩莖等，初期病斑呈水浸狀，隨後組織

壞疽而呈角斑狀，並在葉背病斑處或其他被害組織上產生白色游走孢子囊。另於適合發病的環境下，病菌於一些葉背產胞，滿佈全葉，無角斑狀病徵，隨後葉片乾枯掉落。果房罹病時，罹病處呈水浸狀，組織變褐色，果軸處腫大扭曲，隨後乾枯斷落。本病在本省主要發生在夏果 4 月底至 6 月間，冬果 9 月至 11 月初，嚴重時常導至顆粒無收的地步，是本省葡萄栽培前期的主要限制因子(5)。

本病在世界其他主要栽培區如歐洲、南美、南非、澳大利亞、日本、中國等地亦為主要病害(12)。有關本病的發生預測及防治試驗在國外研究頗多(13)，然而鑑於台灣葡萄栽培多為二收，產期與國外頗不相同，且有關露菌病害發生生態，侵染過程僅有零星報告(1,4)。因此本文亦就有關本菌之侵染過程及藥劑篩選，田間病害發生調查及用藥情形做一報告，以為相關研究之參考。

材料與方法

菌 源

菌源採自彰化縣大村鄉巨峰栽培園之自然罹病葉，病葉取回試驗室後，以自來水洗淨，放入直徑9公分培養皿所製成之濕室中，置於24°C不照光的定溫箱內24小時誘導產孢後，以無菌水製成(濃度 10^4 游走孢子囊/毫升)之接種源。隨後取栽植於溫室之盆栽巨峰葡萄的成熟葉，切成 1.5×1.5 公分小片，每切葉片滴定接種源 $10\text{ }\mu\text{l}$ ，隨即移入24°C定溫箱中，24小時後吸去水滴，復置於定溫箱內，4天後可以在接種處產生大量白色孢囊，如此反覆三次，即以切葉片大量培養供組織學試驗之用。菌源材料約每7天以切葉繼代培養一次。溫室接種試驗則是將上述接種源，接種於溫室巨峰品種之葉片上，隨即套袋保濕並置於24°C之植物生長箱內，4天後可以取得大量接種源為盆栽植株接種之用。

侵染過程

以 $10\text{ }\mu\text{l}$ 之 10^4 游走孢子囊/毫升滴定切葉片接種後，每隔30分鐘將接種處切下，以飽和水化氯醇(Chloral hydrate, Fluka Chem.)透化72小時後，以無菌水洗淨，再以0.1%棉藍乳酚液(Cotton blue-lactophenol)染色24小時後，再移入乳酚液中退染，隨即鏡檢觀察

菌絲之侵染情形。掃瞄及穿透電子顯微鏡觀察以前述材料依高等氏之方法製備(3)，並以日立S-410掃瞄式顯微鏡及日立H-300穿透式電子顯微鏡觀察及照相。

室內藥劑篩選

供試藥劑共15種，測定各藥劑對游走孢子囊釋放游走子的影響，其普通名稱，商品名，有效成份及中文普通名稱列於表一。將藥劑配成各種不同濃度後，再將游走孢子囊置於各濃度藥劑溶液中，置於24°C定溫箱中，4小時後取出以棉藍乳酚液固定後，計算釋放游走子之游走孢子囊百分率，求出各藥劑之最低抑制濃度(MIC min)，最高無效濃度(NEC max)，並以機差數值估算出50%抑制濃度(EC₅₀)之範圍。

藥劑對切葉上產孢之影響，係用政府已推薦之殺菌劑10種，按推薦濃度於接種前24小時，接種後24小時，96小時及120小時後浸藥，對照則用水洗去已產孢者，再經96小時，觀察各處理之切葉再產孢情形。每處理三切葉片，接種源濃度及接種方式則如前述。

溫室藥效試驗

本試驗則以58%鋅錳滅達樂可濕性粉劑400倍，80%鋅錳乃浦可濕性粉劑600倍及72%鋅錳克絕可濕性粉劑750倍為供試藥劑，於噴藥24小時，1週及2週後，接種 10^4 游走孢子囊/毫升濃度之游走孢子囊懸浮液至液滴程度止，測定藥劑在植株上之有效保護期

表一、篩選防治葡萄露菌病用藥之普通名、商品及中文普通名

TABLE 1. Common name, trade name and Chinese common name of fungicides screened for the control of grape downy mildew disease

Common name	Trade name	Chinese common name
35% Benalaxy W.P.	Galben	本達樂
8% Benalaxy + 50% Folpet W.P.	Galben F	福爾本達樂
8% Benalaxy + 64% Mancozeb W.P.	Galben M8	鋅錳本達樂
Copper sulfate	—	硫酸銅
80% Cymoxanil W.P.	Curzate	克絕
8% Cymoxanil + 64% Mancozeb W.P.	Curzate M	鋅錳克絕
8% Cymoxanil + 67% Metiram W.P.	Aviso	免得克絕
80% Fosetyl-Al W.P.	Aliette	福賽得
50% Fosetyl-Al + 25% Folpet W.P.	Mikal	福賽培
80% Mancozeb W.P.	Dithane M	鋅錳乃浦
63% Mancozeb-Cu W.P.	Cuprosan 311	銅鋅錳乃浦
70% Metalaxyl W.P.	Ridomil	滅達樂
10% Metalaxyl + 48% Mancozeb W.P.	Ridomil MZ	鋅錳滅達樂
8% Oxadixyl + 56% Mancozeb W.P.	Sandofan M8	鋅錳歐殺斯
33.5% Oxine copper E.C.	Quinolate	快得寧

間，每處理為 8 棵，置於 24°C 植物生長箱中並套袋保濕，病害等級則每一葉片按發病面積大小而分級，以 0 表示未發病，1 表示發病面積占全葉 1-5%，2 表示發病面積占全葉 6-15%，3 表示發病面積占全葉 16-40%，4 表示發病面積占全葉 41% 以上，並依下列公式計算罹病度，且進行顯著性測驗，以瞭解各藥劑之藥效。

$$\text{罹病度} = \Sigma \frac{\text{指數} \times \text{該指數罹病葉片數}}{4 \times \text{調查葉數}} \times 100\%$$

田間藥效試驗

田間試驗採用單劑及輪用藥劑之藥效試驗兩種。單一藥劑以新社巨峰栽培園之 1985 年夏果及 1989 年冬果為供試對象，以 58% 鋅錳滅達樂 400 倍，80% 鋅錳乃浦 600 倍及福賽得 800 倍為供試藥劑，1985 年噴藥日期為 4 月 8 日、4 月 18 日、4 月 27 日、5 月 5 日、5 月 13 日、5 月 20 日，調查日期則除與噴藥日期相同外，另於 5 月 30 日再調查一次。1989 年之供試藥劑相同，噴藥日期則為 8 月 14 日、8 月 21 日、8 月 28 日、9 月 4 日，調查日期除上述噴藥日外，另增加 9 月 11 日、9 月 18 日及 9 月 25 日。試驗皆採逢機完全區集 (RCBD) 設計，每處理區 5 × 4 平方公尺，於發病初期開始施藥，施藥時以傳統背囊式手壓五孔噴頭噴藥筒為之，單位平均用水量為 0.15 L/m²。調查時每區於 3 × 2 平方公尺區域內，數 100 葉片，並依上述室內藥劑篩選所列方法及公式求罹病度，所得結果並進行變方分析及顯著性測驗。

輪用藥劑試驗則以 1985 年冬果及 1987 年夏果於新社地區進行，田間試驗設計如前述，1985 年用藥時期為 9 月 19 日、9 月 25 日及 10 月 3 日共三次，三種組合中第一組合以 58% 鋅錳滅達樂 400 倍、80% 鋅錳乃浦 600 倍及 72% 鋅錳克絕 750 倍三種藥劑間隔 7-10 天輪用，第二組合以 72% 鋅錳克絕 750 倍及 58% 鋅錳滅達樂 400 倍輪用，第三組合為不噴藥對照。1987 年用藥時期為 5 月 2 日、5 月 12 日、5 月 21 日及 6 月 2 日共四次，亦分三組合，第一組合為鋅錳滅達樂、鋅錳乃浦及鋅錳克絕，為顧及其它病害發生，第三次噴撲克拉錳；第二組合為鋅錳克絕、鋅錳乃浦、鋅錳滅達樂輪用，倍數如前；第三組合為不噴藥對照。夏果在開花前期第一次用藥，1985 年冬果在萌芽 3 個展開葉後用藥。

1990 年夏果於新社，選擇前期作罹病度在 30% 以上之果園進行試驗，3 月 28 日開花，於 4 月 5 日發現果園有一病葉後，立即開始進行露菌病防治，4 月 5 日使用 72% 鋅錳克絕 750 倍，4 月 13 日使用 80% 鋅錳乃浦 600 倍，4 月 27 日使用 72% 鋅錳克絕 750 倍，同

時間並調查鄰近果園農民自行用藥及其發病情形，以茲比較。

結 果

侵染過程


24°C 定溫箱培養產生之游走孢子囊，配成懸浮液後，約 1 小時便開始釋放游走子，游走子雙鞭毛（圖一、二），於釋放後 20-60 分鐘內靜止，並經氣孔侵入寄主內（圖三），隨即形成氣孔下囊（圖四）。接種約 6 小時後形成第一個吸器，24°C 下培養 96 小時後，能產生新的游走孢子囊（圖五），游走孢子囊無法主動釋放，但遇水即脫落，並釋放游走子侵染寄主。

藥劑對游走孢子囊釋放游走子之影響

測試 15 種殺菌劑結果如表二，抑制游走孢子囊釋放游走子效果較佳者為鋅錳乃浦及鋅錳乃浦的混合劑，其中完全抑制濃度 (MIC) 在 12.5 ppm 以下者為 80% 鋅錳乃浦 10 ppm，58% 鋅錠滅達樂 12.5 ppm 及 63% 銅鋅錳乃浦 7.5-12.5 ppm。至於 64% 鋅錠歐殺斯之 MIC 則介於 10-25 ppm 之間。保護性藥劑中福爾培 (Folpet)、硫酸銅 (Copper sulfate)、免得克爛 (Metiram) 等完全抑制濃度均在 50 ppm 左右，其效果較鋅錳乃浦為差。以滅達樂 (Metalaxyl) 及克絕 (Cymoxanil) 之單劑測試其抑制釋放游走子之效果，結果 MIC 分別為 1500 ppm 及 1000 ppm。由此可知該兩藥劑的作用機制不在於抑制游走子之釋放。

切葉片浸藥劑對本菌致病及產胞之影響

切葉片於接種病菌前 24 小時，接種後經 24 小時、96 小時、120 小時進行浸藥處理之結果如表三。接種前 24 小時浸藥者，供試藥劑中除鋅錠歐殺斯，銅鋅錳乃浦，鋅錠本達樂等 3 種有少許發病外，均完全抑制本病菌產胞。接種經 24 小時後才浸藥時，則僅福賽得 800 倍、鋅錠克絕 750 倍及鋅錠滅達樂 400 倍有完全抑制產胞的效果；鋅錠乃浦、松香酯酮、鋅錠本達樂效果次之，但所有供試藥劑與對照皆達 5% 顯著差異。接種後 96 小時用藥時，原已產胞者皆被殺死，再經 96 小時觀察時，鋅錠乃浦、鋅錠克絕及鋅錠滅達樂抑制再產胞效果最佳。120 小時後用藥則僅鋅錠克絕仍具完全抑制再產胞的效果，次好者為鋅錠乃浦，鋅錠滅達樂、鋅錠歐殺斯。顯然接種前藥劑處理，所有藥劑皆有保護效果，但接種 24 小時後，菌絲已在寄主內生長，大多數保護劑均無良好防治效果，系統性藥劑因可在植物體內移行，故顯現殺菌效果。



圖一、*Plasmopara viticola* 游走孢子囊釋放游走子。線長 = 15 μm

Fig. 1. Zoospore discharge of *Plasmopara viticola*. bar = 15 μm

圖二、*Plasmopara viticola* 游走子及空的游走孢子囊。線長 = 30 μm

Fig. 2. Zoospore and empty zoosporangia. bar = 30 μm

圖三、游走子在寄主氣孔上聚集，靜止發芽並侵入寄主氣孔。線長 = 30 μm

Fig. 3. Zoospores aggregated on stomata, encysted and penetrated in host stomata. bar = 30 μm

圖四、*Plasmopara viticola* 侵入寄主後4小時，在寄主內形成氣孔下囊。線長 = 10 μm

Fig. 4. The substomatal vesicles formed under lower epidermis 4 hr after penetration. bar = 10 μm

圖五、*Plasmopara viticola* 之游走孢子囊及游走孢子囊柄。線長 = 15 μm

Fig. 5. Zoosporangia and sporangiophore of *P. viticola*. bar = 15 μm

表二、15種殺菌劑對對葡萄露菌病菌游走子孢囊釋放游走子之影響

TABLE 2. Dosal effect of 15 fungicides on the zoospore discharge of *Plasmopara viticola*

Fungicide	Chinese name	Dose (ppm)		
		NEC (Max) ¹	EC ₅₀ ²	MIC ³
Benalaxyl + Mancozeb	鋅錳本達樂	0.1-1	50	50
Cymoxanil + Mancozeb	鋅錳克絕	0.5	1-5	50
Mancozeb	鋅錳乃浦	1-5	1.6	10
Metalaxyl + Mancozeb	鋅錳滅達樂	1	2.5-5	>12.5
Benalaxyl + Folpet	福爾本達樂	1	1.25	100
Fosetyl-Al + Folpet	福賽培	1-1.25	5-6.25	50
Copper sulfate	硫酸銅	1	3.1-5	50
Mancozeb-Cu	銅鋅錳乃浦	1-1.3	1.3-2.5	7.5-12.5
Oxadixyl + Mancozeb	鋅錳歐殺斯	2.5	1-10	10-25
Cymoxanil + Metiram	免得克絕	3.1	10-12.5	50
Benalaxyl	本達樂	12.5	50-100	500
Fosetyl-Al	福賽得	31.25	50	80
Oxine copper	快得寧	25-50	100-250	1000
Metalaxyl	滅達樂	100	500-750	1500
Cymoxanil	克絕	125	500	1000

1. NEC (Max): The maximum non-effective concentration.

2. EC₅₀: The effective concentration of 50% inhibition.

3. MIC: The minimum inhibitory concentration.

表三、接種前、後不同時間浸漬殺菌劑對切葉片上葡萄露菌游走孢子囊產生的影響

TABLE 3. Effect of fungicides applied before and after inoculation¹ on the sporulation of *Plasmopara viticola* on the grape leaf discs

Fungicide (diluted concentration)	Chinese name	Number of zooporangia/leaf disc			
		Time for fungicide treatment either before (-) or after (+) inoculation			
		- 24 hr	+ 24 hr	+ 96 hr	+ 120 hr
Control (Water)		86.67 a ²	88 a	57.7 a	115.7 a
Oxine copper (1500 X)	快得寧	0 c	59.7 b	74.7 a	40.7 b
Oxadixyl + Mancozeb (500 X)	鋅錳歐殺斯	9 b	45.3 c	54.3 ab	22.3 de
Mancozeb-Cu (600 X)	銅鋅錳乃浦	4 bc	34 d	11.3 de	15.5 e
Copper hydroxide (800 X)	氫氧化銅	0 c	29.3 d	31.8 cd	41 b
Mancozeb (600 X)	鋅錳乃浦	0 c	16.7 e	0.3 e	16.3 de
Copper linoleate (1000 X)	松香脂銅	0 c	12 e	61 a	26.3 cd
Benalaxyl + Mancozeb (1000 X)	鋅錳本達樂	8.3 b	11.3 e	25.7 cd	29.3 cd
Fosetyl-Al (800 X)	福賽得	0 c	0 f	37.3 bc	26.3 cd
Cymoxanil + Mancozeb (750 X)	鋅錳克絕	0 c	0 f	0 e	0 f
Metalaxyl + Mancozeb (400 X)	鋅錳滅達樂	0 c	0 f	0 e	20 de

1. Detached leaf discs were inoculated with zoospore suspension (10^4 zoospore/ml) and incubated at 24°C in the dark.

Number of zoosporangia was counted 96 hr after fungicide treatment.

2. Data followed by the same letter within each column are not significantly different at $P = 0.05$, according to Duncan's multiple range test.

溫室藥效試驗

室內篩選結果最佳之三種藥劑為 58% 鋅錳滅達樂、80% 鋅錳乃浦及 72% 鋅錳克絕。該三種藥劑以植物保護手冊推薦濃度進行溫室篩選試驗，在溫室環境下藥效在植物體上雖然至第二週仍與對照有顯著差異，但噴藥處理經二週接種時已無法完全抑制產胞(表四)，可知藥效已有衰退的現象。

田間單藥劑試驗


1985年夏果(圖六 A)係在病徵開始出現前噴藥，4月27日病徵開始出現時，各處理間無顯著差異，5月5日起各處理間開始有所差異，5月13日對照區發病達到13%，而福賽得處理區僅1.0%、鋅錳滅達樂區則為1.4%、鋅錳乃浦區則為4.7%，可知各處理間以福賽得及鋅錳滅達樂效果最佳，鋅錳乃浦則較差。1989年冬果(圖六 B)於田間平均發病度達15%左右才開始用藥，共計用藥四次至9月4日止，調查結果知至9月25日各處理間與不噴藥對照區仍呈顯著差異，其中鋅錳克絕區罹病度為0.4%、鋅錠滅達樂區為2.6%、鋅錠乃浦區則為5.4%、不噴藥對照則達16.1%。

田間輪用藥劑試驗

1985年冬果(圖七 A)，於剛要發病之9月19日始至10月3日共噴藥三次，罹病度僅1.2%及6.5%，對照不噴藥區則達34%。1987年夏果(圖七 B)，用藥共三次，至6月10日調查罹病度僅為2.0%及8.5%，對照區則達78%，發病極為嚴重。

1990年夏果試驗與鄰近農民自行防治之效果比較如下，供試田於3月28日開始開花，4月5日首次於田間調查時發現一片罹露菌病葉，隨即分別於4月5日、4月13日、4月27日分別使用鋅錳克絕750倍，

鋅錳乃浦600倍及鋅錳克絕750倍防治，試驗期間4月14日至4月25日連續降雨，至5月9日調查，供試園罹病度小於1%，鄰近5個農民自行防治果園罹病度則分別為5.3%、2%、9%、9.6%及45.3%，均較供試果園發病嚴重，其中罹病度在2%者之果農每2天用藥一次，罹病度在5.3%之果農則每隔3天用藥一次。其餘各田之用藥次數因園主未提供詳細資料而未知，但均較供試田之用藥次數為多。至於罹病度在45.3%者，乃發病太嚴重而廢耕者。



圖六、單一藥劑對葡萄露菌病之防治效果。

Fig. 6. Effect of single fungicides on controlling grape downy mildew disease in 1985 (A) and 1989 (B). Arrow indicates spray date. (F-Al: 80% Fosetyl-aluminum, M + M: 10% metalaxyl + 48% mancozeb W.P., M: 80% mancozeb W.P., C + M: 80% cymoxanil + 64% mancozeb W.P.)

表四、噴藥後不同時間分別接種葡萄露菌之發病情形

TABLE 4. Persistence of different fungicides against *Plasmopare viticola*


Treatment	Chinese name	Disease incidence (%) ¹		
		24 hr ²	1 wk	2 wk
Metalaxyl + Mancozeb 400 X	鋅錠滅達樂	0	0	6.8 a ³
Mancozeb 600 X	鋅錠乃浦	0	0	7.6 a
Cymoxanil + Mancozeb 750 X	鋅錠克絕	0	0	9.4 a
Control		64.3	83.3	49.1 b

1. Disease incidence was surveyed one week after inoculation.

2. Time for inoculation after fungicide sprayed.

3. Data followed by the same letter are not significantly different according to Duncan's multiple range test at $P = 0.05$.

Standard deviation was ± 11.8 , ± 6.7 , ± 8.9 and ± 3.7 , respectively, in the order listed.



圖七、1985年(A)及1987年(B)田間不同用藥組合對葡萄露菌病之防治效果。

Fig. 7. Effect of different spray combination of fungicides on controlling grape downy mildew disease in 1985 (A) and 1987 (B). Arrow indicates spray date. (M + M: 10% metalaxyl + 48% mancozeb W.P., M: 80% mancozeb W.P., C + M: 8% cymoxanil + 64% mancozeb W.P., T: 5% triadimefon W.P., P: 50% prochloraz Mn. Triadimefon and prochloraz Mn were used to control powdery mildew.)

討 論

世界主要葡萄栽培區，葡萄露菌病菌多以卵孢子形態越冬，次年卵孢子發芽產生游走孢子囊，做為第一次感染源，因此在病害預測上多以卵孢子發芽之溫度、濕度為預測依據(12)。本省地處亞熱帶，高溫多濕，葡萄產期調節各地又不相同，幾乎全年皆有葡萄栽培，因此國外之預測方式並不適於我國。作者於1985年起，於台中新社、東勢、霧峰本所及彰化大村、溪湖等地經過多年調查，一直無法找到卵孢子，因此認為本菌卵孢子在本省病害傳播上並不占有重要地位。觀察田間發病初期，罹病葉多集中在下三葉位，甚少超過第五葉位，病菌可能有芽潛伏感染的現象，值得加以深入探討。

殺菌劑對葡萄露菌的藥效試驗的研究頗多(6,9, 10,14,15)，近年來仍以醯基苯胺劑(Acylanilides)為主，該類藥劑中又由於滅達樂抑制效果或防治效果最優而最受重視(8)，雖乏抑制釋放游走子的效果(7)，但抑制產孢的效果極佳(7)。本試驗所得結果亦如此，相

當一致。克絕(Cymoxanil)對本菌侵染行為的影響大體與滅達樂相近似，但一般言，考慮此等藥劑易導致抗藥性菌群之增加，原藥廠多以混合劑方式使用來延長藥劑之使用壽命(7)。由1985年及1987年輪用藥劑結果知以系統劑鋅錳滅達樂，鋅錳克絕及保護劑鋅錳乃輪用的方式，共計用藥3或4次可以於田間有效防治本病害，唯用藥時間需提前在剛開始發病時或根據田間經驗在發病前便開始用藥。根據作者等調查，本病在本省發生時間，夏果約在葡萄著果前後，多於梅雨期發生，若當年梅雨期提前，則病害稍提前，反之則延後。冬果則多在萌芽後三週內便開始發病。為何每年之發病時間大體一致，感染源自何處而來？詳細原因仍待探討。但在田間對農民建議用藥時機上，建議夏果自花期便開始用藥，而冬果則於萌芽約3個展開葉時便開始用藥，對田間葡萄露菌病可收到良好防治效果。

在法國本病多發生在4月下旬至8月中旬，需配合病害預測以決定用藥時期的研究歷史頗早，研究亦多，依據地點不同，用藥次數便有差異，少則1至2次，多則需12至15次之間，平均亦需5至6次之間(11)。在本省，以本文所研究之方法進行葡萄露菌病防治，已在田間得到很好效果，尤其在彰化地區葡萄栽培面積達三千公頃，用上述藥劑輪用的方式，並配合果農研究班實施共同防治，露菌病已不再成為該地區葡萄的重要病害。

誌 謝

本文為台灣省農業藥物毒物試驗所研究報告第12號。

參考文獻

- 呂理燊、吳宏國. 1982. 葡萄露菌病菌接種，產胞及胞囊之發芽. 植保會刊 24:161-170。
- 林煥煜. 1990. 台灣葡萄產銷簡析. 農情報導 67-68:1-4。
- 高清文、郭克忠、呂理燊. 1990. 葡萄苦腐病之病徵，病原菌及其侵染過程. 植保會刊 32:256-264。
- 郭克忠、高清文、曹燕青. 1986. 溫度對葡萄露菌病菌產孢及游走子釋放之影響. 植保會刊 28:437 (摘要)。
- 郭克忠. 1988. 本省常見葡萄病害及防治. p.145-151. 葡萄生產技術. 林嘉興、張林仁編. 省台中農改場。
- Clerjeau, M., Moreau, C., and Piganeau, B. 1985. A method for assessing the frequency of acylalanine-

- resistant strains within populations of *Plasmopara viticola* and its application in monitoring vineyards in France. EPPO Bull. 15:423-430. (in French)
7. Cohen, Y., and Coffey, M. D. 1986. Systemic fungicides and the control of Oomycetes. Annu. Rev. Phytopathol. 24:311-338.
 8. Edgington, L. V. 1981. Structure requirements of systemic fungicides. Annu. Rev. Phytopathol. 19:101-124.
 9. Gaulliard, J. M. 1985. Efficacy of fosetyl-Al against *Plasmopara viticola* strains resistant to acylalanides. EPPO Bull. 15:437-441. (in French)
 10. Grabski, C., and Gisi, U. 1987. Qualification of synergistic interactions of fungicides against *Plasmopara* and *Phytophthora*. Crop Prot. 6:64-71.
 11. Lafon, R., and Bulit, J. 1981. Downy mildew of the vine. Pages 601-614 in: The Downy Mildews. D. M. Spencer, ed. Academic Press. London, UK. 636pp.
 12. Lafon, R., and Clerjeau, M. 1988. Downy mildew. Pages 11-13 in: Compendium of Grape Diseases. R. C. Pearson and A. C. Goheen eds. APS Press, Minnesota, U.S.A. 93pp.
 13. Miller, P. R., and O'Brien, H. J. 1957. Prediction of plant disease epidemics. Annu. Rev. Microbiol. 11:77-110.
 14. Raynal, G., Ravise, A., and Bornpeix, G. 1980. Action of aluminium tris-o-ethyl phosphonate on *Plasmopara viticola* pathogenicity and on stimulation of defence reactions of grape vine. Ann. Phytopathol. 12(3):163-175. (in French)
 15. Williams, D. J., Beach, B. G. W., Hordiere, D., and Marechal, G. 1977. LS 74-783, a new systemic fungicide with activity against Phycomycete diseases. Proc. 1977 Br. Crop Prot. Conf. Pests Dis. 2:565-573.

ABSTRACT

Kuo, K. C.¹ Kao, C. W.² and Leu, L. S.¹ 1992. Control of grape downy mildew disease in Taiwan. Plant Pathol. Bull. 1:49-56. (1. Taiwan Agricultural Chemicals and Toxic Substances Research Institute, Wufeng, Taichung, 2. Council of Agriculture, Executive Yuan, Taipei, R.O.C.)

Zoospore discharge of grape downy mildew fungus, *Plasmopara viticola* occurred one hour after the zoosporangium suspension was incubated at 24°C in the dark. Infection was completed in 20–60 min after zoospores contacted with host leaf tissues. The first haustorium was formed 6 hr after inoculation and zoosporangial formation was observed 96 hr after inoculation. Of the 15 commercial fungicides tested for efficacy against zoospore discharge, mancozeb was the most effective with minimum inhibition concentration (MIC) at 10 ppm. The systemic fungicides, metalaxyl and cymoxanil had no effect on zoospore discharge. Efficacy of 10 commercial fungicides applied either before or after inoculation against the sporulation ability of *P. viticola* was determined on detached grape leaf discs. All tested fungicides were effective in inhibition of sporangial formation when applied 24 hr before inoculation. But only 80% fosetyl-Al, 8% cymoxanil + 64% mancozeb, and 10% metalaxyl + 48% mancozeb completely inhibited sporangial formation when applied 24 hr after inoculation. Application at 96 hr and 120 hr after inoculation, mixtures of mancozeb with either cymoxanil or metalaxyl showed the best efficacy not only on killing sporangia but also on inhibition of sporangial reformation. The effectiveness of 80% mancozeb, 8% cymoxanil + 64% mancozeb, and 10% metalaxyl + 48% mancozeb on the potted plants reduced greatly after two weeks at the greenhouse condition. In field trials, the alternative spray of 8% cymoxanil + 64% mancozeb, 80% mancozeb and 10% metalaxyl + 48% mancozeb gave the best control efficacy against grape downy mildew disease, and the total protective period lasted for about one month.

Keywords: grape downy mildew, fungicides, control.